

**PIPP Dolore acuto neonato
(Premature Infant Pain Profile, Stevens, 1996)**

Dati cartella	Indicatore	0	1	2	3	Risultato
	Età gestazionale	≥ 36 sett.	32-35 sett.	28-31 sett.	< 28 sett.	
Osservazione per 15 sec.	Stato comportamentale	Veglia attiva Occhi aperti Mimica facciale presente	Veglia calma Occhi aperti Mimica facciale assente	Sonno attivo Occhi chiusi Mimica facciale presente	Sonno quieto Occhi chiusi Mimica facciale assente	
Frequenza cardiaca (F.C.) e SatO2 di base (prima della procedura)						
Osservazione per 30 sec. dall'inizio della procedura	F.C. max	Incremento 0-4 battiti/min	Incremento 5-14 battiti/min.	Incremento 15-24 battiti/min.	Incremento ≥ 25 batt/min	
	Sat. O2 min	Diminuzione 0-2.4%	Diminuzione 2.5-4.9%	Diminuzione 5-7.4%	Diminuzione ≥ 7.5 %	
	Aggrottamento sopracciglia	Assente, 0-9% del tempo (< 3 sec.)	Minimo, 10-39% del tempo (per 3-12 sec.)	Moderato, 40-69% del tempo (per 12-20 sec.)	Massimo, ≥ 70% del tempo (> 20 sec.)	
	Strizzamento occhi	Assente, 0-9% del tempo (< 3 sec.)	Minimo, 10-39% del tempo (per 3-12 sec.)	Moderato, 40-69% del tempo (per 12-20 sec.)	Massimo, ≥ 70% del tempo (> 20 sec.)	
	Approfondimento solco naso-labiale	Assente, 0-9% del tempo (< 3 sec.)	Minimo, 10-39% del tempo (per 3-12 sec.)	Moderato, 40-69% del tempo (per 12-20 sec.)	Massimo, ≥ 70% del tempo (> 20 sec.)	
≤ 6 dolore minimo o assente; ≥ 12 dolore moderato o severo				Punteggio totale		